



Posizione 3 B: controllo della glicemia

CCO c: Svolgimento di accertamenti e controlli di tipo medico

Cognome / Nome / Numero	Data / Inizio / Fine
.....

Introduzione:

Una signora di circa 50 anni d'età desidera sottoporsi a un controllo della glicemia. Predisposizione familiare. È stanca, irritabile e ha sempre fame e sete.

Informazioni dettagliate sulla situazione con la clientela

Il colloquio dura circa 15 minuti e comprende i seguenti punti (in totale due accertamenti / controlli di tipo medico della posizione 3; 30 minuti):

- **Richiesta, motivo:** Desidera misurare la glicemia, a causa della predisposizione familiare
- **Anamnesi familiare:** Madre affetta da diabete di tipo 2
- **Stato attuale:** A digiuno
- **Sintomi:** Aumentata sensazione di fame e sete, irritabilità, stanchezza
- **Situazioni a rischio:** Fumatrice
- **Altri medicinali:** Oestrogel
- **Altre malattie e terapie:** Menopausa
- **Valori misurati (da consegnare al/alla candidato/a dopo lo svolgimento):** 10 mmol/l

Materiale / documenti necessari

Risultati della misurazione



Posizione 3 A: controllo della glicemia

CCO c: Svolgimento di accertamenti e controlli di tipo medico

Cognome / Nome / Numero	Data / Inizio / Fine
----------------------------------	-------------------------------

Introduzione:

Una signora di circa 50 anni d'età desidera sottoporsi a un controllo della glicemia. Predisposizione familiare. È stanca, irritabile e ha sempre fame e sete.

Griglia di osservazione

	Criteri e indicatori	Aspettative	Osservazioni
Identificazione	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Richiesta, motivo<input type="checkbox"/> Anamnesi familiare<input type="checkbox"/> Stato attuale<input type="checkbox"/> Sintomi<input type="checkbox"/> Situazioni a rischio<input type="checkbox"/> Altri medicinali<input type="checkbox"/> Altre malattie e terapie		
Informazioni e consenso	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Spiegazione dello svolgimento della prestazione<input type="checkbox"/> Costo della prestazione<input type="checkbox"/> Obbligatorio: richiedere accordo esplicito (consenso)	Occorre interrompere il/la candidato/a se non è stato richiesto il consenso esplicito e non è stato proposto prima della prestazione – dopo chiarimento, proseguimento del lavoro	



Posizione 3 A: controllo della glicemia

	Criteri e indicatori	Aspettative	Osservazioni
Preparazione	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Obbligatorio: preparazione delle superfici di lavoro (pulizia, disinfezione, protezione)<input type="checkbox"/> Obbligatorio: igiene personale<input type="checkbox"/> Preparazione degli strumenti di lavoro<input type="checkbox"/> Scelta del dito<input type="checkbox"/> Preparazione del dito	<p>Occorre interrompere il/la candidato/a in caso di messa in pericolo del/della paziente (inosservanza degli indicatori obbligatori) – dopo chiarimento, proseguimento del lavoro</p> <ul style="list-style-type: none">- Sedia pulita e igienizzata- Disinfezione della superficie di lavoro- Disinfezione delle mani- Guanti- Dispositivo del test- Strisce reattive- Scelta del dispositivo pungidito giusto- Dispositivo pungidito monouso- Tampone- Disinfettante- Cerotti- Contenitore per i rifiuti (Cuscino riscaldante)- Temperatura della mano- Quale mano, quale dito- Preparare il dito- Determinare la posizione della puntura- Disinfettare il dito	



Posizione 3 A: controllo della glicemia

	Criteri e indicatori	Aspettative	Osservazioni
Svolgimento e documentazione	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Obbligatorio: uso corretto del pungidito<input type="checkbox"/> Prelievo e trasferimento del sangue<input type="checkbox"/> Cura della ferita<input type="checkbox"/> Documentazione dei valori	<p>Occorre interrompere il/la candidato/a in caso di messa in pericolo del/della paziente (inosservanza degli indicatori obbligatori) – dopo chiarimento, proseguimento del lavoro</p> <ul style="list-style-type: none">- Asciugare la prima goccia di sangue- Depositare/trasferire il sangue sul dispositivo del test- Fermare l'emorragia- Applicare un cerotto- Presentare i valori della situazione del paziente (10mmol/l)- Documentazione dei valori con schema di valutazione	



Posizione 3 A: controllo della glicemia

	Criteri e indicatori	Aspettative	Osservazioni
Convalida dei risultati con il/la farmacista	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Interpretazione corretta dei valori<input type="checkbox"/> Convalida e discussione dei valori con il/la farmacista	<ul style="list-style-type: none">- Il candidato / la candidata trasmette le informazioni alla paziente dopo consultazione con il farmacista.	



Posizione 3 A: controllo della glicemia

	Criteri e indicatori	Aspettative	Osservazioni
Informazioni a paziente e conclusione colloquio	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Comunicazione completa dei valori al/alla paziente<input type="checkbox"/> Offerta di assistenza successiva / triage<input type="checkbox"/> Proposte di misure di prevenzione adatte	<ul style="list-style-type: none">- Iperglicemia, si consiglia un consulto medico- Diario della glicemia per la misurazione regolare dei livelli di glucosio nel sangue- Consigli igienici e dietetici- Evitare il consumo di alcolici	